

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης : Πληροφορίες για τον ασθενή

Lymphomyosot, δισκία

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 7 ημέρες.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών

1. Τι είναι το Lymphomyosot και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Lymphomyosot
3. Πώς να πάρετε το Lymphomyosot
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Lymphomyosot
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Lymphomyosot και ποια είναι η χρήση του

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό προϊόν για την προώθηση της φυσιολογικής λεμφικής παροχέτευσης και την ελάττωση του λεμφικού οιδήματος.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Lymphomyosot

Μην πάρετε το Lymphomyosot:

- Σε περίπτωση αλλεργίας στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Lymphomyosot.

Λόγω του ομοιοπαθητικού χαρακτήρα των δραστικών ουσιών, είναι πιθανή μία προσωρινή επιδείνωση των συμπτωμάτων (αρχική επιδείνωση). Αυτές οι αντιδράσεις είναι ως επί το πλείστον ακίνδυνες. Εάν δεν υπάρξει βελτίωση των συμπτωμάτων, τότε θα πρέπει να διακόπτεται η λήψη του φαρμάκου. Μετά την υποχώρηση της αρχικής επιδείνωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το φάρμακο αυτό. Σε νέα επιδείνωση των συμπτωμάτων θα πρέπει να διακόπτεται η λήψη του φαρμάκου.

Η μακροχρόνια θεραπεία με Lymphomyosot θα πρέπει να παρακολουθείται από έναν γιατρό, καθώς η μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ανεπιθύμητων συμπτωμάτων (νέα συμπτώματα).

Άλλα φάρμακα και Lymphomyosot

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Lymphomyosot με τροφή και ποτό

Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις, και δεν αναμένεται καμία αλληλεπίδραση λόγω του επιπέδου των ομοιοπαθητικών αραιώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην παράγραφο 3.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα, ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού.

Δεν υπάρχουν δεδομένα για την επίδραση στη γονιμότητα.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Lymphomyosot δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Το Lymphomyosot περιέχει λακτόζη.

Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα (όπως η λακτόζη), επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

3. Πώς να πάρετε το Lymphomyosot

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Δοσολογία

Η συνιστώμενη δόση είναι:

Για ενήλικες και εφήβους άνω των 12 ετών: Λαμβάνετε 1 δισκίο 3 φορές ημερησίως.

Τρόπος χορήγησης

Από του στόματος χρήση.

Αφήστε το δισκίο να διαλυθεί αργά κάτω από την γλώσσα. Λαμβάνετε το δισκίο πριν από τα γεύματα.

Αραιώστε τις δόσεις όταν τα συμπτώματα βελτιώνονται και διακόψτε τη λήψη του φαρμάκου όταν εξαλειφθούν.

Διάρκεια χρήσης

Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 7 ημέρες.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Lymphomyosot από την κανονική

Λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης των δραστικών συστατικών στα ομοιοπαθητικά σκευάσματα, όπως το Lymphomyosot, είναι εξαιρετικά απίθανό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από υπερδοσολογία. Ωστόσο, πρέπει να δίνεται προσοχή για να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης δοσολογίας. Εάν έχετε υπερβεί τη συνιστώμενη δοσολογία και δεν αισθάνεστε καλά, απευθυνθείτε σε γιατρό.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Lymphomyosot

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Lymphomyosot

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις. Η συχνότητα των ενεργειών αυτών δεν είναι γνωστή.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr> <http://www.kitrinikarta.gr>

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Lymphomyosot

Το φάρμακο αυτό πρέπει να διατηρείται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Διατηρείτε τον περιέκτη καλά κλεισμένο.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχουν τα δισκία Lymphomyosot

1 δισκίο (301,5mg) περιέχει:

- Οι δραστικές ουσίες είναι: Myosotis arvensis D3 15mg, Veronica officinalis D3 15mg, Teucrium scorodonia D3 15mg, Pinus sylvestris D4 15mg, Gentiana lutea D5 15mg, Equisetum hyemale D4 15mg, Smilax utilis D6 15mg, Scrophularia nodosa D3 15mg, Juglans regia D3 15mg, Calcium phosphoricum D12 15mg, Natrium sulfuricum D4 15mg, Fumaria officinalis D4 15mg, Levothyroxin D12 15mg, Araneus diadematus D6 15mg, Geranium robertianum D4 30mg, Nasturtium officinale D4 30mg, Ferrum jodatum D12 30mg.
- Τα άλλα συστατικά είναι: στεατικό μαγνήσιο.

Εμφάνιση των δισκίων Lymphomyosot και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία παρέχονται σε χάρτινο κουτί που περιέχει θήκη διανομής χαπιών (περιέκτη από πολυπροπυλένιο) με ενσωματωμένο πώμα από πολυπροπυλένιο χωρητικότητας 50 δισκίων.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Γερμανία
Τηλ: + 49 72 21 / 501-00
E-mail: info@heel.com

Τοπικός Αντιπρόσωπος για Ελλάδα:

ASK PHARMACEUTICAL Μ ΕΠΕ
Ασκληπιού 13
Τ.Κ. 14568 Κρυονέρι, Διόνυσος
Αττική
Τηλ: +30 210 77 02 711
E-mail: info@askpharma.eu

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον 02/2024.