

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Engystol

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 7 ημέρες.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών

1. Τι είναι το Engystol και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Engystol
3. Πώς να πάρετε το Engystol
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Engystol
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Engystol και ποια είναι η χρήση του

Ομοιοπαθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την ανακούφιση συμπτωμάτων κοινού κρυολογήματος (πυρετό, μυαλγίες, αρθραλγίες).

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Engystol

Μην πάρετε το Engystol:

- **παιδιά κάτω των 6 ετών.**
- σε περίπτωση αλλεργίας στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Engystol.

Καθώς αυτό το φάρμακο περιέχει Sulfur, μην το χρησιμοποιήσετε εάν έχετε πόνο στο αυτί (ωταλγία), φλεγμονή των παραρρινίων κόλπων (παραρρινοκολπίτιδα) ή δερματική πάθηση, εκτός και εάν σας το έχει υποδείξει ο γιατρός σας. Σε περιπτώσεις επίμονων, αδιευκρίνιστων ή νεοεμφανιζόμενων συμπτωμάτων θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.

Άλλα φάρμακα και Engystol

Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις, και δεν αναμένεται καμία αλληλεπίδραση λόγω του επιπέδου των ομοιοπαθητικών αραιώσεων.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα, ως εκ τούτου, δε συνιστάται η χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αθλητικές δραστηριότητες

Δεν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις στην ικανότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, και δεν αναμένεται καμία επίδραση σε σχέση με αυτό το φάρμακο λόγω των ομοιοπαθητικών αραίώσεων.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης, και δεν αναμένεται καμία επίδραση σε σχέση με αυτό το φάρμακο λόγω των ομοιοπαθητικών αραίώσεων.

Το Engystol περιέχει λακτόζη.

Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

3. Πώς να πάρετε το Engystol

Θεραπεία για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι:

- Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:

Δοσολογία σε οξείες καταστάσεις ή αρχική δοσολογία:

1 δισκίο ανά μισή έως 1 ώρα, η δόση να μην υπερβαίνει τα 12 δισκία ημερησίως στη συνέχεια, μετά τη βελτίωση των συμπτωμάτων:

1 δισκίο 3 φορές ημερησίως.

- Παιδιά 6 έως 11 ετών:

Δοσολογία σε οξείες καταστάσεις ή αρχική δοσολογία:

1 δισκίο ανά 1-2 ώρες, η δόση να μην υπερβαίνει τα 8 δισκία ημερησίως στη συνέχεια, μετά τη βελτίωση των συμπτωμάτων:

1 δισκίο 3 φορές ημερησίως.

Τρόπος χορήγησης

Αφήστε το δισκίο να διαλυθεί κάτω από τη γλώσσα. Λαμβάνεται ανεξάρτητα από τα γεύματα. Αραιώστε τις δόσεις όταν τα συμπτώματα βελτιώνονται και διακόψτε τη λήψη του φαρμάκου όταν εξαλειφθούν.

Στα παιδιά, συνθλίψτε το δισκίο και αραιώστε σε λίγο νερό.

Διάρκεια θεραπείας

Η διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα χωρίς ιατρική συμβουλή.

Εάν δεν υπάρξει βελτίωση μετά από μία εβδομάδα θα πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Engystol από την κανονική
Συμβουλευθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Engystol

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Engystol

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθούν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Λόγω του ομοιοπαθητικού χαρακτήρα των δραστικών ουσιών, είναι πιθανή μια προσωρινή επιδείνωση των συμπτωμάτων (αρχική επιδείνωση), διατηρώντας το ισχύον δοσολογικό σχήμα.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος:

<http://www.eof.gr> <http://www.kitrinikarta.gr>

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Engystol

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Το προϊόν αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Engystol

- Οι δραστικές ουσίες είναι:

Sulfur	D4	37,5 mg
Sulfur	D10	37,5 mg

Vincetoxicum hirundinaria	D6	75.0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D10	75.0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D30	75.0 mg
για ένα δισκίο των 301,5 mg.		

Τα συστατικά της σύνθεσης είναι σε συμφωνία με τις μονογραφίες της Γερμανικής Ομοιοπαθητικής Φαρμακοποιίας.

- Τα άλλα συστατικά είναι: μονοϋδρική λακτόζη, στεατικό μαγνήσιο.

Εμφάνιση του Engystol και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Engystol διατίθεται σε μορφή δισκίου.

Χάρτινο κουτί που περιέχει περιέκτη πολυπροπυλενίου με πόμα πολυπροπυλενίου

Φιάλες των 50 δισκίων.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας / διανομέας / παρασκευαστής:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D - 76532 Baden-Baden

GERMANIA

Τηλ: +49 72 21 / 501-00

E-Mail : info@heel.com

Τοπικός Αντιπρόσωπος για Ελλάδα:

ASK PHARMACEUTICAL Μ ΕΠΕ

Ασκληπιού 13

Τ.Κ. 14568 Κρυονέρι, Διόνυσος

Αττική

Τηλ.: (+30) 210 77 02 711

E-Mail : info@askpharma.eu

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον 03/2024.